

RESİMLİ TÜRKİYE FLORASI

Adlandırma

EK-2

Mor renkte olanlar kurallardır.

BÖLÜM, yazarı ve tip cins ile ilgili yazım modeli:

LYCOPODIOPHYTA / KİBRİTOTU BÖLÜMÜ

Lycopodiophyta D.H.Scott, Stud. Foss. Pl.: 13, 500-501 (1900), (Lycopodiales). İngilizce bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – Tip cins: *Lycopodium* L. (1753).

Kibritotu Bölümü

ALTBÖLÜM, yazarı ve tip cins ile ilgili yazım modeli:

LYCOPODIIDAE / KİBRİTOTU ALTSINIFI

Lycopodiidae Bek., Kurs Bot. 1: 115 (1863). Rusça bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – Tip cins: *Lycopodium* L. (1753).

FAMİLYA, yazarı ve tip cins ile ilgili yazım modeli:

AMARANTHACEAE / HOROZİBİĞİGİLLER

Amaranthaceae Juss., Gen. Pl.: 87 (1789), (*Amaranthi* olarak), *nom. cons.* Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – Tip cins: *Amaranthus* L. (1753).

Sin.: *Chenopodiaceae* Vent., Tabl. Regn. Vég. 2: 253 (1799).

LYCOPODIACEAE / KİBRİTOTUGİLLER

Lycopodiaceae P.Beauv. ex Mirb., Hist. Nat. Vég. [Lam. & Mirbel] 4: 293 (1802) [*Lycopodia* olarak]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – Tip cins: *Lycopodium* L. (1753).

CİNS, yazarı ve tip tür ile ilgili yazım modeli:

HUPERZIA / DİKKİBRİTOTU

Yazar: **Mustafa Keskin**

Ressam: **Golshan Zare**

2- Huperzia Bernh., J. Bot. [Schradler] 1800(2): 126 (1801). / **Dikkibritotu**, Türk. Bitkileri List., s. 1 (2012).

Lektotip tür: *H. selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (baz.: *Lycopodium selago* L.).

LYCOPODIUM / KİBRİTOTU

Yazar: **Mustafa Keskin**

Ressam: **Golshan Zare, Sema Niğdeli**

1- Lycopodium L., Sp. Pl. 2: 1100 (1753). / **Kibritotu**, Türk. Bitkileri List., s. 2 (2012).

Lektotip tür: *L. clavatum* L.

Sin.: *Lycopodium* Adans., Fam. Pl. 2: 491 (1763), [fark. telf. / *orth. var.*].

Lepidotis Mirb., Hist. Nat. Veg. (Lam. ve Mirb.) 3: 477 (1802), [lüzs. ad / *nom. superfl.*].

Diphasium C.Presl ex Rothm., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54: 64 (1951).

Diphasiastrum Holub, Preslia 47: 104 (1975).
Lycopodiastrum Holub ex Dixit, J. Bombay Nat. Hist. Soc. 77 (3): 540 (1981); [Holub, Preslia 47(2): 103 (1975), (geçz. ad / *nom. inval.*)].
Pseudodiphasium Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18: 440 (1983).
Pseudolycopodium Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18: 441 (1983); [Preslia 47: 103 (1975), (geçz. ad / *nom. inval.*)].
Austrolycopodium Holub, Folia Geobot. Phytotax. 26(1): 90 (1991).

Melez CİNS örneği

DOĞAL MELEZ CİNS

*×CUPROCYPARIS / *×LEYLANDSERVİSİ

Yazar: **Rahim Anşin**

Ressam: **Sema Niğdeli**

9- *×Cuprocyparis Farjon, Novon 12(2): 188 (2002). / *×**Leylandservisi**, yeni **Türkçe bilimsel ad.** (*Cupressus macrocarpa* Hartw. ex Gordon × *Xanthocyparis nootkatensis* (D.Don) Farjon & D.K.Harder)

Melez tür örneği

(Dryopteris / Pilunç)

D. × initialis Fraser-Jenk. & Corley, Brit. Fern Gaz. 10: 230 (1972). (*D. caucasica* × *D. oreades*). / **Melez pilunç**, Türk. Bitkileri List., s. 6 (2012).

Tip örneği: U.S.S.R., Karachyevo-Cherkesskaya A.O., in valley between Teberda river and Klukhurskiy Peroval, below Gora Dombay Ul'gen, Teberda valley amongst rocks above conifer/hardwood forest, c. 2100 m alt. 11 July 1971, C.R. Fraser-Jenkins 3210 (holo: BM, izo.: LE ve G).

Tip Örnekleri (BAK “Yazım Kuralı-Ek 9-Tip örnekleri)

Sinonim yazılışı [non L. (1753)]

Sin.: *Cassytha* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 345 (1821), [L.'ninki değil (1753) / non L. (1753)].

Sinonim yazılışı [non *Inula squarrosa* L. (1763)]

Sin.: ... *Conyza squarrosa* L., Sp. Pl., 861, (1753) [L.'nin *Inula squarrosa* (1763)'sı değil / non *Inula squarrosa* L. (1763)].

Sinonim yazılışı [non L., Sp. Pl.: 241 (1753)]

Sin.: *C. daucoides* L., Syst. Nat., ed. 12. 2: 205 (1767), [L.'nin "Sp. Pl.: 241 (1753)"de yayınladığı değil / non L., Sp. Pl. 241 (1753)].

Sinonim yazılışı [non Hoffmanns. & Link (1820), nec Fisch. ex Turcz. (1846)].

Sin.: *Pyrethrum pectinatum* Hausskn., Mitt. Thür. Bot. Ver. 20: 16 (1905), [Hoffmanns. & Link (1820)'inki ile Fisch. ex Turcz. (1846)'inki değil / non Hoffmanns. & Link (1820), nec Fisch. ex Turcz. (1846)]. *Chrysanthemum heterotomum* (Bornm.) Bornm., Feddes Rep. 36: 349 (1934). *Tanacetum pectiniforme* Heywood, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 21: 60 (1952).

Sinonim yazılışı [Sensu auct. / Muhtelif yazarlara göre “muht.yzrl.”]

Carex arenaria Leers, Fl. Herborn.: 195 (1775), sensu auct.

Sensu auct.: Bir ismin orijinal yazarının yaptığı betimden farklı bir tanıma uyan bitki için yanlışlıkla kullanıldığını ifade etmekte kullanılır. Bu ismin, yanlış uygulanmış bir isim olduğunu göstermek için genellikle nec veya non kelimeleri ile kullanılır.

Örnek 1:

Asperula laxiflora Boiss., Fl. Or. 3:37 (1875).

Sin: *A. prostrata* Grossh.'a göre muht.yzrl. ama (Adam) K.Koch (1851)'unki değil / sensu auct. Grossh. non (Adam) K.Koch (1851).

Açıklama1: Burada sinonim olan *A. prostrata* (Adam) K.Koch (1851) ismi değildir, Grossh.'un bu taksona ait olduğunu düşündüğü veya kabul ettiği bitkilerdir.

Örnek 2:

Euphorbia supina Rafin., Amer. Monthly Mag. 2: 119 (1817).

Sin: *E. maculata* muht.yzrl. ama L.'ninki değil (1753) / sensu auct. pl., non L. (1753).

Açıklama2: Burada sinonim olan *E. maculata* L. (1753) ismi değildir, geçmişte çok sayıda yazarın (plur./pl.: çok sayıda yazar) yanlışlıkla bu taksona ait olduğunu düşündüğü veya kabul ettiği bitkilerdir.

Örnek 3:

7- C. soboliferum (Fisch & C.A.Mey.) Stef., Sborn. B'lgar. Akad. Nauk. 22: 44 (1926). /

Koyungöğsü, Türk. Bitkileri List., s. 374 (2012).

Sin: *B. trigynum* Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 380 (1846), [muht. yzrl. / sensu auct.].

"Korunmuş ad / Nomen conservandum" yazılışı [kor. ad / nom. cons.].

MICROMERIA Benth., Edwards's Bot. Reg. 15: t. 1282 (1829), [kor. ad / nom. cons.].

"Korunması önerilmiş ad / Nomen conservandum propositum" yazılışı [kor. önr. ad / nom. cons. prop.].

P. inclinata Vill., Hist; Pl. Dauph. 3: 567 (1788).

Sin.: *P. canescens* Besser, Hist. Pl. Dauphiné (Villars) 3: 567, t. 45 (1788), [kor. önr. ad / nom. cons. prop.].

"Yasadışı ad / Nomen illegitimum" [yasd. ad / nom. illeg.].

Campanula tubulosa (Boiss.) Engl., Nat. Pflanzenfam. Nachtr. [Engler & Prantl] 1: 319 (1897), [yasd. ad / nom. illeg.].

"Geçersiz ad / Nomen invalidum" [geçs. ad / nom. inval.].

Campanula tubulosa (Boiss.) Engl., Nat. Pflanzenfam. Nachtr. [Engler & Prantl] 1: 319 (1897) [geçs. ad / nom. inval.].

"Lüzumsuz ad / Nomen superfluum" [lüzs. ad / nom. superfl.].

D. ruyschiana L., Sp. Pl. 595 (1753).

Sin.: *Dracocephalum alpinum* Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 87 (1796), [lüzs. ad / nom. superfl.].

"Çıplak ad / Nomen nudum" [çıpl. ad / nom. nud.].

P. majus var. *creticum* Rchb. ex Nyman, Consp. Fl. Eur.: 564 (1881), [çıpl. ad / nom. nud.].

"Reddedilmiş ad / Nomen rejciendum" [red. ad / nom. rej.].

Sin.: *Circinus* Medik., Philos. Bot. (Medikus) 1: 208 (1789). [red. ad / nom. rej.].

"Men edilmiş yayın / Opus unique oppressa“ [opus utique oppr.]

D. ruyschiana L., Sp. Pl. 595 (1753).

Sin.: *Dracocephalum angustifolium* Gilib., Fl. Lit. Inch. 1: 78 (1782), [mend. yay. / opus utique oppr.].

"Diğer ad / Nomen alternativum“ [diğ. ad / nom. alt.].

“diğ. ad”=diğer ad/isim; (*nomen alternativum* [nom. alt.])

Arecaceae Bercht. & J.Presl, Přir. Rostlin: 266 (1820),[diğ. ad / nom. alt.:
Palmae]. Çekçe bir diyagnozla

Lektotip belirlenişi

A. bodamae Dingler, Flora 64: 301 (1883). / **Develiotu**, Türk. Bitkileri List., s. 92 (2012).

Lektotip: [Yunanistan] in umbrosis nec non in cultis (solo arenoso) vallis rivi ‘Bodama Su’inter portum Dedeaghatsch dictum et pagum Chryka Thracie meridionalis haud raro, 5 v 1876, Dingler (lekto.: ANK!), (**lektotip burada belirlenmiştir / lectotypus hic designatus / lectotype designated here**).

Yeni düzenleme / comb. nov.

E. dianthoides (Sm.) Ikonn., Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 138 (1973).

subsp. **tuncbasi** (Eren & Parolly) M.Dinç, **yeni düz. / comb. nov. / Tunçkumotu**, Türk. Bitkileri List., s. 338 (2012).

Sin.: *Arenaria dianthoides* subsp. *tuncbasi* Eren & Parolly., Willdenowia 36: 834 (2006).

Yeni düzenleme ve statü / comb. et stat. nov.

F. amana (Rix) Tekşen, **yeni düz. ve st. / comb. et stat. nov. / Maraşlâlesi**, Türk. Bitkileri List., s. 605 (2012).

Sin.: *F. hermonis* Fenzl subsp. *amana* Rix, Kew Bull. 29: 647, f. 2 (1975). *F. amana* (Rix) R.Wallis & R.B.Wallis, Plantsman, n.s., 1(2): 114 (2002). [geçz. ad / nom. inval.].

Yayıllı Örneği.

J. communis L., Sp. Pl. 2: 1040 (1753). / **Ardı**, Türk. Bitkileri List., 12 (2012).

subsp. **saxatilis** (Pall.) E.Murray, Kalmia 12: 21 (1982). / **Bodur ardıç**

Sin.: *Zietenia*....33: 283 (1974).

Türkiye (GD. Anadolu Bölgesi hariç).

A. hirta L., Sp. Pl. 2: 961 (1753). / **Yılanotu**, Türk. Bitkileri List., s. 93 (2012).

Asıl Ege Bölümü; Antalya Bölümü.

A. pontica Lam., Encycl. 1(1): 255 (1783). Zаметki. Sist. Geogr. Rast. 6: 10, t. 1 f. 1 (1939). Çatalca-Kocaeli ve G. Marmara Bölümleri; Karadeniz Bölgesi.

Farklı telâffuz örneği: [‘triumfetti’ olarak].

C. triumfetti (L.) J.Gay, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 867 (1845).

Sin.: *A. tinctoria* var. *triumfetti* L., Sp. Pl. 2: 896 (1753) [‘triumfetti’ olarak].

Farklı telâffuz / Orthographic variant: [fark. telf. / orth. var.].

C. davuricum Fisch. ex Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 65 (1815). / **İriyapraklı Boynuzotu**

Sin.: *C. dahuricum* Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 75 (1821), [farklı telâffuz].

Türkiye Florası için yeni kayıt örneği.

A. calocephalum Wendelbo, Act. Horti Gotob. 28: 40, f.10 (1966). / **Püskül soğanı.....????**
Sin.: *A. orientale* Blakelock, Kew Bull. 8: 211 (1953), [Boiss.'ninki değil (1854)].
Hakkâri Bölümü (M. Koyuncu 12887, AEF 25951).
İran-Turan elementi. **Türkiye Florası için yeni kayıt.**

[Kısmen / pro parte].

C. adjaricum Sommier & Levier, Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2 (2): 20 (1985).
Sin.: *C. noli-tangere* Sommier & Levier, Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2(2): 11 (1895). *C. caucasicum* Petr. subsp. *cladophorum* Petr., Trudy Tiflissk. Bot. Sada 12(1): 39 (1912) [kısmen / pro parte].
D. Karadeniz Bölümü.

Yanlışlıkla / sphalmate [yanlış. sphalm.].

A. tauricola Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2(4): 118 (1859), [yanlış. 'tauriculum'].

Basılmamış sinonim / pro synonymus (bsm. sin./ pro syn.).

A. maurorum L. Sp. Pl., ed. 2, 2: 1363 (1763). / **Kargabardağı**, Türk. Bitkileri List., s. 93 (2012).
Sin. *A. aucheri* Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient. 1: 174, t. 99 (1844). *A. anatolica* Boiss., Fl. Orient. 4: 1080 (1879), [bsm. sin. / pro syn.].

O. trapezuntea Boiss. & A.Huet ex Hand.-Mazz., Ann. Nat. Hofmus. Wien 23: 180 (1909).
Sin.: *O. trapezuntina* A.Huet ex Boiss., Fl. Orient. 4: 201 (1875), [bsm. sin. / pro syn.].

İsmin geçerli olarak yayınlanmamış olması nedeniyle tam bir sinonim, gerçek bir isim olmayan isimler eğer sinonim durumunda ise "basılmamış sinonim / pro synonymus" olarak fade edilir.

Kuşkulu ad / nom. ambig.

A. sphaerocephalon L., Sp. Pl. 297 (1753).
subsp. **sphaerocephalon**.
Sin.: *A. descendens* L., Sp. P. 298 (1753) [kuşk. ad / nom. ambig.]. ...
Istranca, Çatalca-Kocaeli ve Ergene Bölgeleri; Asıl Ege Bölümü; Antalya Bölümü.

Lektotip belirlenmesi ile / by lectotypification (lekto. bel. / by lectotypification).

BUPLEURUM L., Sp. Pl. 236 (1753).
Lektotip tür: *B. rotundifolium* L., Hitchcock'a göre: "Prop. Brit. Bot. 138 (1929)".
Diatropa Dumortier, Fl. Belg. 76 (1827), [lekto. bel. / by lectotypification].

Herbaryum etiketinde / in schedula [herb. etk. / in sched.].

A. graecorum Boiss., Diagn. Pl. Orient. 9: 114 (1849).
Sin.: *A. tournefortii* Heldr., Herb. Graec. Norm.: 1624 (1901) [herb. etk. / in sched.].

Dar anlamda / Sensu stricto [dar anl. / s.str.].

S. minor L., Sp. Pl. 1: 116 (1753).
subsp. **minor**.
Sin.: ... *Sanguisorba minor* Scop., Fl. Carn. 110 (1772), [dar anl. / s. str.].

Geniş anlamda / Sensu lato [gen. anl. / s.l.].

P. recta L., Sp. Pl.: 497 (1753), [gen. anl. / s.l.].

Yeni Tür ve Melez Tür / sp. nov., nothospec. nov.

Aristolochia × guneri Malyer & Tosunoğlu melez tür / nothospec. nov.

[*Aristolochia maurorum* L. × *A. paecilantha* Boiss.]

Planta perennis, media inter parentes. *Aristolochia × gunerii* Malyer & Tosunoğlu nothospec. nov. affinis *A. maurorum* L. forma et coloribus perianthii limbi. Longae-trigonus, densum hirtellum foliis et rubras-viridis perianth color similis *A. paecilantha* Boiss.

Tip örneği: C6 Hatay: d. Antakya (Amanus), Antakya-Yayladag, nr Şenköy, 1000 m, P.H. Davis, D. 27164 [E!].

Ballota antalyense F.Tezcan & H.Duman, yeni tür / sp. nov.

Tip: C3 Antalya: Finike; Turunçova-Elmalı yolu, 5. km, maki, vadi içi, 170 m, 17 vii 1997, F. Tezcan 1701 (holotip: ZZZ; izotipler: ZZZ).

İngilizce veya Latince betim/diyagnoz.

Kromozom sayısı: $2n = 32$.

Çiçeklenme Dönemi ve Yetiştirme Yüksekliği: Haziran-Temmuz, 100-200 m.

Türkçe betim/diyagnoz.